



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(МОЗ України)

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,
web: <http://www.moz.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00012925

16 .06.2016 № 05.2-11/ 15133

На № _____

від _____

**Керівникам структурних підрозділів
з питань охорони здоров'я обласних,
Київської міської державних,
Луганської військово-цивільної
обласної адміністрації**

З метою ефективного проведення обов'язкових профілактичних щеплень, відповідно до наказу МОЗ України від 11.08.2014 № 551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні», Міністерством охорони здоров'я України підготовлено рекомендації з проведення щеплень дитячого населення з порушенням графіку Календаря щеплень.

Пропонуємо розповсюдити та забезпечити використання даних рекомендацій у роботі закладів охорони здоров'я, в яких проводиться планова вакцинація дітей.

Додаток на 3 арк.

Заступник Міністра

Роман ІЛИК

**Рекомендації з проведення вакцинації в Україні
в умовах дефіциту імунобіологічних препаратів та їх нерегулярного
постачання.**

Порядок проведення щеплень дітям з порушенням календарем.

1. Щеплення дітей з порушенням Календаря розпочинається із наявної у закладі ОЗ вакцини з дотриманням мінімальних інтервалів, які вказані в розділі 2 «Щеплення дітей з порушенням Календаря» наказу МОЗ України від 11.08.2014 №551.
(Мінімальний інтервал – інтервал, який допускається до введення вакцини/анатоксину проти однієї і тієї самої інфекції особам з порушенням цього Календаря. Введення чергової дози вакцини/анатоксину з меншим, ніж мінімальний, інтервалом не зараховується. При виборі схеми вакцинації необхідно керуватися інструкцією виробника про застосування вакцини/анатоксину.)
2. Не слід розпочинати серію вакцинації спочатку, якщо була пропущена доза, незалежно від того, скільки часу минуло. Необхідно ввести дози, яких не вистачає, за графіком з дотриманням мінімальних інтервалів.
3. Введена чергова доза вакцини з меншим ніж мінімальний інтервал не зараховується.
4. При проведенні щеплень із застосуванням окремих вакцин або анатоксинів для профілактики різних інфекційних хвороб необхідно дотримуватися таких особливостей їх введення (згідно розділу 2 «Щеплення дітей з порушенням Календаря» наказу МОЗ України від 11.08.2014 №551):
 - a. ≥ 2 інактивовані вакцини та/або анатоксини - вакцини та/або анатоксини можуть бути введені одночасно в різні ділянки тіла або з будь-яким інтервалом між введенням доз відповідно до інструкції про застосування. **Наприклад**, в один день може бути проведена вакцинація проти гепатиту В та АаКДП/АКДП.
 - b. Живі вакцини та інактивовані вакцини або анатоксини - можна вводити одночасно в різні ділянки тіла або з будь-яким інтервалом між введенням доз, відповідно до інструкції; **Наприклад**, в один день може бути проведена вакцинація КПК та АаКДП/АКДП.
 - c. ≥ 2 живі вакцини для парентерального введення (крім БЦЖ) можуть бути введені одночасно в різні ділянки тіла або з інтервалом не менше 1 місяця; **Наприклад**, в один день може бути проведена вакцинація КПК та проти вітряної віспи (рекомендована).

- d. Щеплення БЦЖ не проводять в один день з іншими вакцинами, їх можна вводити не раніше 1 місяця до або після щеплення БЦЖ (крім вакцинації проти гепатиту В).
5. За потреби лікар має право ввести всі вакцини/анатоксини, що показані за Календарем (крім БЦЖ), за одне відвідування особою закладу охорони здоров'я. Ін'єкції можна робити в різні ділянки тіла за умови, що це не суперечить інструкції про застосування конкретної вакцини/анатоксину. В іншому випадку лікар планує такі щеплення з урахуванням мінімальних інтервалів між введенням вакцин/анатоксинів.
 6. Відсутність вакцинації проти одних інфекційних захворювань не є підставою для проведення вакцинації проти інших інфекційних захворювань. **Наприклад**, відсутність вакцинації БЦЖ не є підставою для не проведення вакцинації проти кору, епідпаротиту та краснухи, якщо дитині виповнилося 12 місяців. **Наприклад**, відсутність третьої дози вакцини АаКДП/АКДП не є підставою для не проведення вакцинації дитині, якщо їй виповнилося 12 місяців життя.
 7. Якщо на момент введення ревакцинальної дози менше року часу до віку, в якому передбачено проведення ревакцинації за віком, то така доза зараховується як ревакцинація за віком. **Наприклад**, якщо дитині віком 5 років 3 місяці проведена вакцинація четвертою дозою АаКДП/АКДП (перша ревакцинація в житті), то ревакцинація АДП за віком в 6 років не проводиться. В даному разі наступне щеплення проводиться у відповідності до календаря – за віком в 16 років.

Вакцинація дітей БЦЖ, що не отримали щеплення у відповідності до віку 3-5 добу життя:

1. Щеплення БЦЖ дітей віком до 2 місяців, не щеплених на 3-5 добу від народження, проводиться без попередньої проби Манту.
2. Щеплення БЦЖ дітей віком від 2 місяців до 8 місяців проводиться після попереднього проведення проби Манту у разі негативного результату при відомому контакті з хворим на туберкульоз. В іншому випадку, проведення проби Манту в даному віці не проводиться для вирішення питання вакцинації БЦЖ.
3. Щеплення дітей старше 8 місяців проводиться після проведення проби Манту у разі негативного результату
4. Щеплення БЦЖ може бути проведене протягом 2 місяців при негативному результаті проби.
5. При перевищенні терміну 2 місяців, якщо з будь-яких причин щеплення БЦЖ не було проведене, щеплення проводиться після повторної проби Манту та при її негативному результаті, але не раніше ніж через 6 місяців від попередньої проби Манту.

6. Щеплення вакциною БЦЖ не проводять в один день з іншими вакцинами. Інші профілактичні щеплення можуть бути здійснені з інтервалом не менше 1 місяця до або після щеплення вакциною БЦЖ (крім вакцинації проти гепатиту В). Вакцинація проти гепатиту В може бути проведена з будь-яким інтервалом після щеплення БЦЖ.

Щеплення дорослих.

1. Усі дорослі підлягають ревакцинації АДП-М кожні 10 років.
2. Якщо пропущена доза ревакцинації АДП-М кожні 10 років необхідно ввести дозу АДП-М, яка була пропущена й від цього часу вести відлік часу до наступної ревакцинації АДП-М (10 років).
3. Для ревакцинації проти дифтерії, правця у дорослих може бути використана будь-яка вакцина, що включає в себе дифтерійний та правцевий анатоксини. Наприклад, ревакцинація може бути проведена вакциною АаКДП-М (Бустрікс[®], Адасель[®]) або АаКДП-М-поліо (Бустрікс-поліо[®]).


Щеплення для профілактики правця.

1. У випадку недоступності правцевого анатоксину (АП), екстренна профілактика правця проводиться будь-яким імунобіологічним препаратом, до складу якого входить правцевий анатоксин (АДП, АДП-М, АаКДП/АКДП, АаКДП-М тощо).
2. Проведена екстрена імунопрофілактика правця АП не зараховується як ревакцинація за віком АКДП/АаКДП, АДП, АДП-М.

Щеплення дітей щодо поліомієліту, що взяли участь в раундах вакцинації ОПВ як відповідь на спалах поліомієліту в Україні.

1. Діти, котрі не отримали другої дози в житті інактивованої поліомієлітної вакцини (ІПВ), але отримали під час раундів вакцинацію ОПВ, підлягають щепленню другою дозою ІПВ.
2. Якщо дитині на момент отримання дози ОПВ в рамках раундів вакцинації не виповнилося 6 років, то така дитина підлягає ревакцинації за віком в 6 років.

Директор Департаменту
громадського здоров'я



Світлана ОСТАШКО